

PAKKAUSSELOSTE

Altresyn 4 mg/ml oraaliliuos sioille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Ceva Santé Animale, Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Ranska

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Altresyn 4 mg/ml oraaliliuos sioille.
altrenogesti

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää 4 mg altrenogestia, 0,07 mg butyylihydroksianisolia (E320) ja 0,07 mg butyylihydroksitolueenia (E321)

Kirkas, vaaleankeltainen, hajuton liuos.

4. KÄYTTÖAIHEET

Kiiman synkronointiin sukukypsille ensikoille.

5. VASTA-AIHEET

Ei saa antaa eläimille, joilla on kohtutulehdus. Ei saa antaa urospuolisille eläimille.
Ks. kohta ”Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana”.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tunnetta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselostuksessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittaa kansallista raportointijärjestelmää käyttäen
www.fimea.fi/elainlaakkeet

7. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Sika (sukukypsät ensikot).

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta rehun päällä annettuna.

20 mg altrenogestia/eläin, eli 5 ml eläintä kohti kerran päivässä 18 peräkkäisen päivän ajan.

Varmista, että eläin saa oikean annoksen joka päivä, sillä aliannostelu voi johtaa follikkelikystojen muodostumiseen.

9. ANNOSTUSOHJEET

Yksi 5 ml:n annos annetaan painamalla mittapumppua ja vapauttamalla se.

Eläimet tulee erottaa toisistaan ja lääkityä erikseen. Lisää valmiste rehun päälle mittapumpulla. Lisää valmiste rehun päälle juuri ennen ruokintaa.

Älä ravista liuosta ennen käyttöä, jotta se ei sekoitu painesäiliössä olevan typen kanssa.

10. VAROAIKA (VAROAJAT)

Teurastus: 9 vrk.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä (EXP) jälkeen.

Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Painesäiliö: Säilytä suojassa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C:n lämpötiloille. Ei saa lävistää tai polttaa edes käytön jälkeen.

12. ERITYISVAROITUKSET

Ei saa antaa urospuolisille eläimille.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Eläinlääkevalmiste lisätään rehuun välittömästi ennen ruokintaa. Hävitä syömättä jäänyt lääkitty rehu. Saa käyttää vain sukukypsille ensikoille, joilla on ollut jo yksi kiima.

Osittain syöty rehu on hävitettävä turvallisesti, eikä sitä saa antaa muille eläimille.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Suoraa ihokosketusta on vältettävä. Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineitä ja haalaria). Huokoisia käsineitä käytettäessä valmistetta voi päästä iholle. Jos valmistetta pääsee iholle käsineen alle, käsineen sisältämät läpäisemättömät materiaalit, kuten lateksi tai kumi, voivat lisätä valmisteen imeytymistä ihon kautta.

Jos valmistetta roiskuu vahingossa iholle tai silmiin, se on huuhdottava välittömästi pois runsaalla vedellä. Pese kädet hoidon jälkeen ja ennen aterioita.

Raskaana olevien ja lisääntymisikäisten naisten tulee välttää kosketusta tämän valmisteen kanssa tai noudattaa äärimmäistä varovaisuutta käsitellessään tätä valmistetta.

Henkilöiden, joilla on (todettu tai epäilty) progesteriiniin riippuvaisia kasvaimia tai jokin tromboembolinen häiriö, ei pidä käyttää tätä valmistetta.

Liiallisen altistuksen vaikutukset: Vahingossa elimistöön imeytynyt lääke saattaa aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, kohdun tai vatsan kouristuksia, lisääntynyttä tai vähentyneitä kuukautisvuotoa, raskauden pitkittymistä tai päänsärkyä. Suoraa ihokosketusta on siksi vältettävä.

Liiallisen altistuksen sattuessa ota yhteys lääkäriin.

Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana

Ei saa käyttää tiineille tai imettäville eläimille.

Yhteisvaikutukset, yliannostus, yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Ympäristövaikutuksiin liittyvät varotoimet

Hoidettujen eläinten lantaa levitettäessä on ehdottomasti noudatettava kansallisissa tai paikallisissa säädöksissä määritettyä vähimmäisetäisyyttä pintavesistöihin, sillä lanta voi sisältää altrenogestia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Altresyn ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä. Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

01.03.2019

15. MUUT TIEDOT

Pakkauskoot:

Kotelo, jossa yksi 360 ml:n pakkaus.

Kotelo, jossa kolme 360 ml:n pakkausta.

540 ml:n pakkaus.

1 080 ml:n pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.