

## PAKKAUSSELOSTE

Equimucin Vet 2 g jauhe hevoselle

### 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

CP-Pharma Handelsges. mbH  
Ostlandring 13  
D-31303 Burgdorf  
Saksa

Erän vapauttamisesta vastaavat valmistajat:

CP-Pharma Handelsges. mbH  
Ostlandring 13  
31303 Burgdorf, Saksa

Catalent Germany Schorndorf GmbH  
Steinbeistr. 1 & 2  
73614 Schorndorf, Saksa

Lindopharm GmbH  
Neustrasse 82  
40721 Hilden, Saksa

### 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Equimucin Vet 2 g jauhe hevoselle

Asetyylikysteiini

### 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 annospussi, jossa 6 g jauhetta, sisältää:

*Vaikuttava aine:*

Asetyylikysteiini            2000 mg

*Apuaineet:*

Sakkaroosi  
Vaniliini

### 4. KÄYTTÖAIHEET

Hengitysteiden eritteen viskositeetin vähentäminen pitkään kestäneissä taudeissa, joissa sitkeää limaa erittyy runsaasti.

### 5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä asetyylikysteiinille.  
Ks. myös kohta 12.

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Yliherkkyyttä asetyylikysteiniinille saattaa esiintyä. Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee valmisteen antaminen keskeyttää ja aloittaa oireenmukainen hoito.

## 7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Hevonen.

## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Käytetään rehuun sekoitettuna.

10 mg asetyylikysteiniä painokiloa kohti kahdesti päivässä (vuorokausiannos on 20 mg painokiloa kohti) 20 vuorokauden ajan.

Annostusohje:

Hevosen paino (painokiloa)	Aamuannossuositus (Equimucin Vet jauhe, annospussien määrä)	Ilta-annossuositus (Equimucin Vet jauhe, annospussien määrä)
200 kiloon asti	1 annospussi	1 annospussi
400 kiloon asti	2 annospussia	2 annospussia
600 kiloon asti	3 annospussia	3 annospussia

## 10. VAROAIKA

*Hevonen:*

Teurastus: 0 vrk

Maito\*: 0 vrk

\* Otettava huomioon maissa, joissa hevosenmaitoa käytetään elintarvikkeeksi.

## 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

## 12. ERITYISVAROITUKSET

### **Eläimiä koskevat erityiset varotoimet**

Valmistetta ei saa antaa hevosille, joilla epäillään mahahaavaa.

Koska asetyylikysteini metaboloituu rikkiä sisältäviksi tuotteiksi, sitä on annettava varoen hevosille, joilla tiedetään olevan maksasairaus.

### **Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.

### **Käyttö tiineyden, laktation tai muninnan aikana**

Rotilla ja kaniineilla tehdyissä laboratoriotutkimuksissa ei ole saatu näyttöä epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista. Valmisteen turvallisuutta tiineyden ja laktation aikana ei ole osoitettu. Voidaan käyttää ainoastaan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemään hyöty-haitta -suhteen arviointiin perustuen.

### **Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Asetyylikysteiniä ei saa antaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa yhteensopimattomuusriskin vuoksi.

Ilmoituksissa beetalaktaamiantibioottien (penisilliinit ja kefalosporiinit) ja tetrasykliinien inaktivoitumisesta on tähän mennessä viitattu vain *in vitro* -kokeisiin, joissa nämä aineet on sekoitettu keskenään. Näiden antibioottien antamisen välillä tulee olla vähintään kahden tunnin tauko (ei koske doksisykliiniä).

Asetyylikysteini on yhteensopiva potenttien sulfonamidien ja kaikkien tämänhetkisten keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden kanssa ja sitä voidaan antaa näiden valmisteiden kanssa samanaikaisesti.

Antitussiivisten aineiden samanaikainen antaminen voi aiheuttaa haitallista liman kertymistä yskänrefleksin heikentyessä. Siksi Equimucin Vet jauheen ja antitussiivisten aineiden yhdistelmähoitoa tulee välttää.

### **Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)**

Hevosilla ei esiintynyt haittavaikutuksia, kun valmistetta annettiin suositusannos kolminkertaisena päivittäin neljän viikon ajan.

### **Yhteensopimattomuudet**

Asetyylikysteini voi aiheuttaa antibioottien inaktivoitumista *in vitro*.

### **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on toimitettava apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

### **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

3.7.2015

### **15. MUUT TIEDOT**

Pahvirasia, jossa 100 annospussia (á 6 g jauhetta).

Pahvirasia, jossa 200 annospussia (á 6 g jauhetta).

Pahvirasia, jossa 500 annospussia (á 6 g jauhetta).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:  
Vet Medic Animal Health Oy, PL 27, 13721 Parola