

## PAKKAUSSELOSTE

Norocarp 20 mg ja 50 mg tabletit koiralle

### 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Irlanti

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Norbrook Laboratories Limited  
Station Works  
Camlough Road  
Newry  
Co. Down, BT35 6JP  
Pohjois-Irlanti

### 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Norocarp 20 mg tabletti koiralle  
Norocarp 50 mg tabletti koiralle  
karprofeeni

### 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

**Vaikuttava aine:**

Norocarp 20 mg: 20 mg karprofeenia.  
Norocarp 50 mg: 50 mg karprofeenia.

**Apuaineet:** Mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, povidoni K30, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti.

Valkoinen/keltaisenvalkoinen pyöreä tabletti.

### 4. KÄYTTÖAIHEET

Tulehduksen ja kivun lievittäminen luusto-, lihas- ja nivelperäisissä sairauksissa sekä leikkausten jälkeisen kivun hoito koirilla.

### 5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää eläimille, jotka kärsivät maha-suolikanavan häiriöistä (mukaan lukien mahasuolikanavan invasiiviset kirurgiset toimenpiteet), verenvuotohäiriöistä, munuaisten toimintahäiriöistä, keskinkertaisesta/vakavasta maksan tai sydämen toimintahäiriöistä tai eläimille, jotka ovat yliherkkiä valmisteelle.

Ei saa käyttää kissoille.

### 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Tulehduskipulääkevalmisteiden käytön haittavaikutuksia ovat muun muassa oksennus, ripuli, ruoansulatuskanavan verenvuodot, ruokahaluttomuus, apatia sekä maksa- ja munuaisvauriot. Nämä

haittavaikutukset ovat useimmiten tilapäisiä, mutta voivat harvinaisissa tapauksissa olla vakavia tai johtaa kuolemaan.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## **7. KOHDE-ELÄINLAJIT**

Koira.

## **8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN**

Vuorokausiannos on 4 mg/kg. Vuorokausiannos tulee jakaa kahteen samansuuruiseen annokseen. Hoitoajan ylittäessä 14 vuorokautta eläinlääkärin tulee tutkia koira säännöllisesti.

Leikkauksen yhteydessä annetun parenteraalisen hoidon jälkeen tulehduksen ja kivun hoitoa voidaan jatkaa suun kautta Norocarp-tableteilla annoksella 4mg/kg/vrk jaettuna kahteen samansuuruiseen annokseen 5 päivän ajan.

Annetaan suun kautta.

## **9. ANNOSTUSOHJEET**

-

## **10. VAROAIKA**

Ei oleellinen.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

## **12. ERITYISVAROITUKSET**

Käytettäessä valmistetta alle 6 viikon ikäisille pennuille tai hyvin vanhoille koirille, pitää noudattaa varovaisuutta. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa, kun lääkitään eläintä, jolla on nestehukka, hypovolemia tai eläintä, jolla on sydän-, maksa- tai munuaissairauksia, tai infektioita.

Samanaikaista lääkitystä voimakkaasti munuaistoksisten lääkevalmisteiden tai muiden tulehduskipulääkevalmisteiden kanssa pitää välttää. Muita tulehduskipulääkkeitä, steroideja tai antikoagulantteja ei tule käyttää samanaikaisesti tai 24 h ennen tai jälkeen karprofeenin käytön. Karprofeeni sitoutuu voimakkaasti proteiineihin ja se saattaa tämän vuoksi kilpailla muiden lääkeaineiden kanssa sitoutumisesta proteiineihin.

Tutkimusten puuttuessa ei saa käyttää tiineyden aikana. Karprofeeni kulkeutuu maitoon, joten sitä ei saa käyttää imettäville nartuille.

Eläinlääkärin tulee seurata hoitovastetta säännöllisesti pitkäaikaishoidossa.

## **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

## **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

15.01.2019

## 15. MUUT TIEDOT

Polypropyleenipurkki, jossa polyeteenistä valmistettu korkki.

20 mg: 100 ja 500 tablettia.

50 mg: 100 ja 500 tablettia.

PVC/alumiinivalmisteinen läpipainopakkaus:

20 mg: 10, 20 ja 100 tablettia.

50 mg: 10, 20 100 ja 500 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Vet Medic Animal Health Oy

PL 27, 13721 Parola