

BIPACKSEDEL

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Equimucin vet 2 g oralt pulver för häst

2. Sammansättning

Varje dospåse innehåller:

Aktiv substans:

Acetylcystein 2000 mg

Vitt eller ljusgult pulver.

3. Djurslag

Häst.



4. Användningsområden

Minskning av trakeobronkialslemmets viskositet vid kroniska bronkopulmonära sjukdomar åtföljda av avvikande slemsekretion och slemansamling.

5. Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. Se också avsnitt "Särskilda varningar".

6. Särskilda varningar

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Får inte ges till hästar som misstänkas att ha magsår. Då acetylcystein metaboliseras till svavelhaltiga ämnen, bör läkemedlet användas med försiktighet hos hästar med leversjukdomar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Skyddsutrustning i form av skyddshandskor ska användas vid hantering av läkemedlet.

Dräktighet och digivning:

Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte gett några bevis för teratogena effekter. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Acetylcystein skall ej blandas eller lösas upp med andra veterinärmedicinska läkemedel då inkompatibilitetsreaktioner kan uppstå.

Rapportering av inaktivering av beta-laktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner) och tetracykliner är hittills enbart baserat på in vitro-studier där de aktuella substanserna har blandats direkt. Ett intervall av minst två timmar skall tillåtas gå innan administrering av de här antibiotika sker (detta gäller ej doxycyklin).

Acetylcystein är kompatibelt med potentika sulfonamider och alla tillgängliga bronkodilatorer och kan ges samtidigt med dessa.

Vid samtidig användning av hostdämpande medel kan avsevärda mängder sekret ansamlas på grund av nedsatt hostreflex, varför en sådan kombinationsbehandling noggrant bör övervägas.

Överdoser:

Daglig oral administrering av 3 gånger rekommenderad behandlingsdos under en period av 4 veckor till häst tolererades utan biverkningar.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Acetylcystein kan förorsaka inaktivering av antibiotika *in vitro*.

7. Biverkningar

Häst:

Obestämd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):	Överkänslighetsreaktioner
--	---------------------------

Skulle tecken på intolerans uppträda, avbryts behandlingen med läkemedlet och symptomatisk behandling inleds.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning eller dennes lokala företrädare genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

webbplats: <https://www.fimea.fi/sv/veterinar>

8. Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Oral användning.

Användning i foder.

10 mg acetylcystein / kg kroppsvikt två gånger dagligen (daglig dos 20 mg acetylcystein / kg kroppsvikt) i 20 dagar.

Rekommenderad dos:

Hästens vikt (kg / kroppsvikt)	På morgonen (Läkemedel, antal dospåsar)	På kvällen (Läkemedel, antal dospåsar)
upp till 200 kg	1 dospåse	1 dospåse
upp till 400 kg	2 dospåsar	2 dospåsar
upp till 600 kg	3 dospåsar	3 dospåsar

9. Råd om korrekt administrering

10. Karenstider

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: noll dygn

Mjolk: noll timmar

11. Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på dospåsen och kartongen efter Exp.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

13. Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.

14. Nummer på godkännande för försäljning och förpackningsstorlekar

MTnr: 19169

Dospåse innehållande 6 g pulver.

Förpackningsstorlekar:

Kartong med 100 dospåsar (å 6 g pulver).

Kartong med 200 dospåsar (å 6 g pulver).

Kartong med 500 dospåsar (å 6 g pulver).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

15. Datum då bipacksedeln senast ändrades

14.04.2026

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf, Tyskland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Lindopharm GmbH

Neustrasse 82

40721 Hilden, Tyskland

Lokal företrädare och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY

PB 27, FI-13721 PAROLA

Tel: +358 3 630 3100

E-mail: laaketurva@vetmedic.fi

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.